

## Fiberoendoskopowa skala nasilenia dysfagii - Fiberoendoscopic Dysphagia Severity Scale (FEDSS) dla chorych w ostrym okresie udaru (Dziewas i wsp. 2008)

<u>Protokół FEDSS</u>	<u>Główne objawy</u>	<u>Konsekwencje kliniczne</u>	<u>Punkty</u>
Ślina	Penetracja/aspiracja	Nic doustnie, sonda żołądkowa, rozważyć intubację	6
↓			
Konsystencja półstała	Penetracja/aspiracja bez wystarczających odruchów obronnych	Nic doustnie, sonda żołądkowa	5
↓			
Konsystencja półstała	Penetracja/aspiracja obecne wystarczające odruchy obronne	Sonda żołądkowa, pokarmy doustnie tylko podczas terapii logopedycznej	4
↓			
Płyny	Penetracja/aspiracja bez wystarczających odruchów obronnych	Sonda żołądkowa, pokarmy doustnie tylko podczas terapii logopedycznej	4
↓			
Płyny	Penetracja/aspiracja obecne wystarczające odruchy obronne	Dieta przecierana doustnie, płyny dożylnie	3
↓			
Konsystencja stała	Penetracja/aspiracja lub nasilone zaleganie w dołkach przednagłośniowych i/lub zachyłkach gruszkowatych	Dieta przecierana i płyny doustnie	2
↓			
Konsystencja stała	Nieobecne penetracja/aspiracja ani nasilone zaleganie w dołkach przednagłośniowych i/lub zachyłkach gruszkowatych	Miękka/normalna dieta i płyny doustnie	1

Tłumaczenie Dr n. med. Anna Czernuszenko