

Przesiewowy test połykania wg. Daniels 1997

Imię i nazwisko _____

Data badania _____

Uwaga! Zanim wykonasz badanie upewnij się, że chory jest przytomny, jest w stanie czuć i współpracować przez 15 minut, jama ustna jest czysta, chory jest w stanie przełknąć własną ślinę a jego głos nie jest wilgotny/bulgoczący. W przeciwnym razie ze względu na wysokie prawdopodobieństwo aspiracji odstęp od podawania wody.

Przeciwwskazania do podania wody

Chory nie jest w stanie czuć i współpracować przez 15 minut

Chory nie przełyka własnej śliny

Chory ma wyjściowo wilgotny, bulgoczący głos

Nieobecne ww. przeciwwskazania do podania wody

TAK

!

!

!

zakończ test

kontynuuj test

Interpretacja: Stwierdzenie 2 z 6 poniższych objawów wskazuje na obecność średnio ciężkiej i ciężkiej dysfagii (czułość 92%, swoistość 67%). Walidacja w udarze mózgu.

1. Dysfonia

2. Dyzartria

3. Upośledzony kaszel na polecenie

4. Nieprawidłowy odruch gardłowy – osłabiony, asymetryczny lub zniesiony.

5. Kaszel w teście połykania wody

5ml

5ml

10ml

10ml

20ml

20ml

6. Zmiana jakości głosu w teście połykania wody

Test połykania wody: Kolejno podaje się choremu 5ml, 10ml i 20 ml, każdą objętość po 2 razy. Należy przerwać test w przypadku kaszlu lub zmiany jakości głosu.

Podpis osoby przeprowadzającej badanie